



Recommandations relatives au PSC 1
Version 2017

PLAIE

Modification demandant une information.

	PSC 1 2012	PSC 1 2017
	Version 1.1.1	Version 1.2.1
Fiche de procédure Plaie	<p>Risques</p> <p>Le tétanos est une maladie très grave, parfois mortelle. Seule la vaccination antitétanique effectuée tous les 10 ans chez l'adulte ou de 5 ans chez l'enfant, protège de cette maladie.</p> <p>Conduite à tenir. Face à une plaie grave</p> <p><input type="checkbox"/> Allongée, yeux fermés en demandant de ne pas bouger la tête en présence d'une plaie à l'œil.</p> <p>Face à une plaie simple.</p> <p><input type="checkbox"/> Conseiller de consulter un médecin :</p> <p>- en l'absence de vaccination antitétanique valide.</p>	<p>Risques</p> <p>Le tétanos est une maladie très grave, parfois mortelle. Seule la vaccination antitétanique protège de cette maladie.</p> <p>Conduite à tenir. Face à une plaie grave</p> <p>Rajout</p> <p><input type="checkbox"/> en cas d'hémorragie, arrêter le saignement (Cf. hémorragies externes)</p> <p><input type="checkbox"/> Si la plaie est située au niveau du thorax, la laisser à l'air libre.</p> <p><input type="checkbox"/> Allongée, yeux fermés en demandant de ne pas bouger la tête en présence d'une plaie à l'œil et si possible en maintenant sa tête à deux mains.</p> <p>Face à une plaie simple.</p> <p><input type="checkbox"/> Conseiller de consulter un médecin ou un autre professionnel de santé :</p> <p>- pour vérifier la validité de la vaccination antitétanique</p>